

ЯК ЗАПОБІГТИ ІНФІКУВАННЮ?




Уникайте доступу людей, транспортних засобів та обладнання до стада



Забезпечте періодичну дезінфекцію місць утримання тварин, обладнання, одягу та взуття



Не купуйте тварин без ветеринарних документів



Ізольуйте новозаведених тварин



Забезпечте належну утилізацію гною, сміття та мертвих тварин



Повідомляйте ветеринарну службу про виявлених мертвих кабанів та диких жуйних тварин

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ПІДОЗРИ СПАЛАХУ ХВОРОБИ?



Ізольуйте всіх тварин, які підозрюються в інфікуванні



Регулярно прибирайте та зберігайте ізольованими: гній, залишки корму та підстилку



Застосуйте відповідні додаткові заходи біобезпеки для уникнення ризику поширення хвороби



Припиніть усе переміщення тварин до або з господарства



Надайте компетентному органу всю відповідну інформацію щодо хвороби



Дотримуйтеся інструкцій щодо контролю хвороби, наданих компетентним органом



ЯЩУР
НА ПОДВІРНИХ ГОСПОДАРСТВАХ



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

ЩО ТАКЕ ЯЩУР?

ЯЩУР – це висококонтагіозна вірусна хвороба, яка вражає здебільшого велику рогату худобу та свиней, проте також може вражати овець, кіз та інших парнокопитних жуйних тварин

Понад **60 штамів**

Люди можуть хворіти на ящур та здатні переносити вірус у респіраторному тракті **протягом 24-48 годин**

Має сильний вплив на **сільське господарство та секторальну економіку**




Спалах хвороби в країні миттєво викличе заборону експорту тварин і тваринної продукції до всіх країн, вільних від ящуру

Хвороба може призводити до **летальних випадків** серед дорослих тварин

Має здатність **швидко поширюватися** на значні території


У разі інфікування молодняку - може спостерігатися **високий падіж**

ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЯЩУР?



Прямий контакт із інфікованими свійськими або дикими тваринами

Виділяється через дихання, зі слини, фекалій та сечі, молока та сперми (за 4 дні до появи клінічних ознак)



Забруднені продукти тваринного походження

Здатний до виживання від одного дня до декількох тижнів в органічній матерії

- ◆ необроблені забруднені м'ясні продукти (згодовування харчових відходів)
- ◆ забруднене молоко



Через предмети, фоміти або ятрогенно

Забруднений одяг, взуття, обладнання чи матеріали (сіно, корм, вода, молоко або біопрепарати)



Може передаватися повітрям (вітром)

Низькі температури та висока вологість сприяють передачі вірусу вітром (до 60 км - сушею, 300 км - морем)


ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
від декількох днів до 2 тижнів

ЯК РОЗПІЗНАТИ ЯЩУР?

Важкість клінічних ознак залежатиме від штаму вірусу, віку, виду та породи інфікованих тварин

ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ

✚ Везикули та ураження



✚ Слиновиділення

✚ Анорексія

✚ Кульгавість

✚ Лихоманка

✚ Знижена молочна продуктивність

✚ Аборт і раптова загибель новонародженого молодняку



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійських або диких тварин, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу* у вашому районі або області

*Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сайт служби dpss.gov.ua