

Що робити у разі підозри хвороби?

- ✓ **Ізолюйте** усіх тварин, які підозрюються в інфікуванні
- ✓ **Зберігайте** послід, включно зі сміттям та використаним настилом, та будь-який продукт, матеріал або речовину ізольованими й захищеними від комах та гризунів
- ✓ **Застосуйте** відповідні додаткові заходи біобезпеки для уникнення ризику поширення хвороби
- ✓ **Надайте** компетентному органу всю відповідну інформацію щодо хвороби
- ✓ **Дотримуйтеся** інструкцій щодо контролю хвороби, наданих компетентним органом



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійської чи дикої птиці, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу* у вашому районі або області



ГРИП ПТИЦІ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПТИЦІ



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

*Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Сайт служби dpss.gov.ua та avianflu.vet.ua

Що це таке?

ГРИП ПТИЦІ - це висококонтагіозна вірусна хвороба, що здатна вразити і свійську, і дику птицю

Деякі штами – **ЗООНОЗНІ***
Передача людині може мати місце під час близького безпосереднього контакту з інфікованою птицею або сильно забрудненим середовищем



ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ В ДВОХ ФОРМАХ

НИЗЬКОПАТОГЕННИЙ - практично не викликає клінічних ознак у птиці

ВИСОКОПАТОГЕННИЙ - може викликати важкі клінічні ознаки та потенційно високий падіж птиці

- ◆ Хвороба може мати значний негативний вплив на **здоров'я тварин, здоров'я людей та економіку країни**
- ◆ Може спричинити **високий падіж**
- ◆ Підтвердження хвороби може негативно вплинути **на торгівлю** на уражених територіях

*Зоонози - хвороби, спільні для людей і тварин

Як передається?

- ◆ Через **прямий контакт** із інфікованою свійською або дику птицею
- ◆ Через **предмети або фоміти** (вірус здатен до виживання в середовищі протягом тривалого періоду часу)
- ◆ Виділяється **з посліду та респіраторної секреції**



Інкубаційний період хвороби **від декількох днів до 2 тижнів**

Як запобігти інфікуванню?



мийте та дезінфікуйте транспортні засоби кожного разу, коли вони потрапляють на господарство



проведіть навчання для персоналу щодо заходів біобезпеки з метою попередження грипу птиці

Важливо

Перевозьте птицю



тільки з перевірених **благополучних господарств**



за наявності **ветеринарних документів**