



Карантинні організми
Поширення на території України





дізнатися більше

ВУЗЬКОЗЛАТКА ЯСЕНЕВА СМАРАГДОВА

Небезпечний карантинний шкідник
(*Agrilus planipennis* Fairmaire)

- ⚠ загибель ясенів
- ⚠ економічні збитки



У разі виявлення
будь-яких карантинних організмів
зверніться до територіального підрозділу
Держпродспоживслужби у вашій області



Фінансується
Європейським Союзом



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА



Карантинні організми
Поширення на території України



дізнатися більше

ВУЗЬКОЗЛАТКА ЯСЕНЕВА СМАРАГДОВА

Небезпечний карантинний шкідник
(*Agilus planipennis* Fairmaire)

⚠ загибель ясенів

⚠ економічні збитки



РОСЛИНИ- ГОСПОДАРІ

всі види роду ясенів
(*Fraxinus* spp.)

у разі
високої щільності
популяції

Chionanthus virginicus L.
(сніговець/хіонантус
віргінський)



в Україні
вперше виявили
на ясені
пенсільванському
(*Fraxinus pennsylvanica*)




У разі виявлення
будь-яких карантинних організмів
зверніться до територіального підрозділу
Держпродспоживслужби у вашій області


ОЗНАКИ ПОШКОДЖЕННЯ



відмирання
окремих гілок/
всихання
всього дерева



відростання
пагонів
від стовбура



звивисті ходи
під корою, у камбії
«серпантиноподібні»
«змієподібні»

зазвичай
3,5-4 мм



D-подібні
вихідні отвори
дорослої особини



Фінансується
Європейським Союзом



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

Публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу



Карантинні організми
Поширення на території України



дізнатися більше

ВУЗЬКОЗЛАТКА ЯСЕНЕВА СМАРАГДОВА

Небезпечний карантинний шкідник (*Agrilus planipennis* Fairmaire)

⚠ загибель ясенів

⚠ економічні збитки



МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ

ФЕРОМОННІ ПАСТКИ

призмові

- на сонячній стороні
- посеред крони між гілками
- на висоті від 2 до 5 м

липкі

- фіолетові або сині
- на сонячній стороні
- на кілочках під деревами або на стовбурах

РЕКОМЕНДАЦІЇ

встановлення

1 пастка на 5 га
t повітря = 15°C

перевірка

під час заміни/
2 рази на місяць

заміна

протягом 60 днів

ЛОВИЛЬНІ ПОЯСИ

на деревах

- на відкритому просторі (вздовж узбіччя або в полі)
- у вигляді живоплоту (2-3 сторони дерева здебільшого відкриті)
- на узліссі чи вздовж межі насаджень (крона освітлена з 1-2 сторін)

У разі виявлення
будь-яких карантинних організмів
зверніться до територіального
підрозділу Держпродспоживслужби
у вашій області

ПЕРША ПОЯВА дорослих особин

збігається з
періодом цвітіння
робінії звичайної
(*Robinia pseudoacacia*)

в Україні
травень-червень



Фінансується
Європейським Союзом



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

Публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу



Карантинні організми
Поширення на території України




дізнатися більше

ВУЗЬКОЗЛАТКА ЯСЕНЕВА СМАРАГДОВА

Небезпечний карантинний шкідник
(*Agrilus planipennis* Fairmaire)

- ⚠ загибель ясенів
- ⚠ економічні збитки



ТРАНСПОРТНІ
ЗАСОБИ

із зон масового
розповсюдження

САМОСТІЙНІ
ПЕРЕЛЬОТИ

ШЛЯХИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ДЕРЕВИНА ТА
ВИРОБИ З НЕЇ

- в т.ч.
- пакувальний матеріал
 - кругла деревина
 - гілки
 - дрова
 - тріски > 2,5 см

САДЖАНЦІ
ЯСЕНА

→ або
ін. рослин-господарів

У разі виявлення
будь-яких карантинних організмів
зверніться до територіального
підрозділу Держпродспоживслужби
у вашій області



Фінансується
Європейським Союзом



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

Публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу