

Додаток 2  
до Інструкції з профілактики  
та ліквідації сальмонельозу птиці  
(пункт 1 розділу III)

**Кількість та кратність відбору зразків продукції птахівництва для  
дослідження на сальмонельоз в межах офіційного контролю на потужностях  
(об'єктах) з переробки продуктів забою птиці та виробництва яєчних  
продуктів**

№ з/п	Дослідний об'єкт	Об'єкт аналізу, дослідний матеріал		План відбору зразків <sup>(1)</sup>		Межі виявлення <sup>(2)</sup>		Кількість зразків/ кратність відбору
				п	с	m	M	
1	2	3		4		5		6
<b>На потужностях (об'єктах) з виробництва яєчних продуктів та переробки продуктів забою птиці</b>								
1	Продукти птахівництва	Яйцепродукти	яєчний порошок	5	0	відсутність в 25 г		зразки повинні бути відібрані з 5 різних місць (точкові зразки) загальною вагою 0,2 кг/1 раз на місяць
			меланж	5	0	відсутність в 25 г		зразки повинні бути відібрані з 5 різних місць (точкові зразки) загальною вагою 0,2 кг/1 раз на місяць
			яєчна маса для переробки	5	0	відсутність в 25 г		зразки повинні бути відібрані з 5 різних місць (точкові зразки) загальною вагою 0,2 кг/1 раз на місяць
2	Санітарно-гігієнічний контроль приміщень та обладнання	Переробний цех	змиви по ходу технологічного процесу	змиви, взяті загалом з площі 900 см <sup>2</sup> через 1 год. після початку робочого процесу з різних місць дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву / 1 раз на місяць)				
			змиви	змиви, взяті загалом з площі 900 см <sup>2</sup> , або зразки пилу не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву (пилу)/ 1 раз на місяць)				
		Холодильні (морозильні) камери для зберігання яйцепродуктів	змиви	змиви, взяті загалом з площі 900 см <sup>2</sup> , або зразки пилу не менш як з 10 різних місць дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву (пилу)/ 1 раз на місяць)				

1	2	3	4	5	6		
<b>На потужностях (об'єктах) з утримання стад птиці м'ясних порід та переробки продуктів забою птиці (бройлерів, курей на м'ясо, індиків, качок, гусей, голубів, фазанів, перепелів, страусів тощо)</b>							
1	Продукти птахівництва*	Тушка птиці	шкіра шиї	50	5 <sup>(3)</sup>	відсутність в 25 г	
		Продукти забою птиці	свіже м'ясо птиці	50 <sup>(3)</sup>	0 <sup>(3)</sup>	відсутність в 25 г	5 об'єднаних зразків, що складаються зі зразків шкіри шиї по 10 г, відібраних від 15 тушок птиці після охолодження (5 x 30 г) / 1 раз у 7 днів
			субпродукти	5	0	відсутність в 25 г	5 зразків, що складаються зі зразків, відібраних з 5 різних місць (точкові зразки), вагою 0,3 кг / 1 раз на тиждень
		Продукти забою птиці	напівфабрикати	5	0	відсутність в 25 г	5 зразків, що складаються зі зразків, відібраних з 5 різних місць (точкові зразки), вагою 0,3 кг / 1 раз на тиждень
			м'ясний фарш	5	0	відсутність в 25 г	5 зразків, що складаються зі зразків, відібраних з 5 різних місць (точкові зразки), вагою 0,3 кг / 1 раз на тиждень
			м'ясо механічного обвалювання	5	0	відсутність в 25 г	5 зразків, що складаються зі зразків, відібраних з 5 різних місць (точкові зразки), вагою 0,3 кг / 1 раз на тиждень

\* У разі якщо у забійному цеху проводиться забій птиці з різних стад (площадок)/ господарств, контроль проводиться з такою самою періодичністю, але окремо для кожного стада (площадки)/ господарства.

## Продовження додатка 2

Крім птиці особистих селянських господарств, в яких утримується менше ніж 350 голів птиці.

<sup>(1)</sup>  $n$  – кількість одиниць, що складають зразок;  $c$  – кількість зразків, в яких виявлена сальмонела.

<sup>(2)</sup>  $m = M$  – межі виявлення.

<sup>(3)</sup> 50 зразків одержують з 10 послідовних кількостей відбору зразків.

Примітка. Інтерпретація результатів: задовільний - за наявності сальмонел максимум у зразках  $c/n$ ; незадовільний - за наявності сальмонел більше, ніж у зразках  $c/n$ .